

INTÉGRATION – Chapitre 1/2

▶ Tout le cours en vidéo : <https://youtu.be/pFKzXZrMVxs>



En 1696, Jacques Bernoulli reprend le mot latin « integer », déjà utilisé au XIV^e siècle, pour désigner le calcul intégral. A cette époque, on parlait de l'équation de la courbe pour calculer l'aire sous la courbe, c'est à dire du « bord » de la surface à la surface entière (intégrale).
Au milieu du XIX^e siècle, les sciences sociales reprennent le mot pour exprimer l'idée qu'une personne s'intègre à un groupe.

Partie 1 : Intégrale et aire


1) Unité d'aire

Dans le repère (O, I, J) , le rectangle rouge a comme dimension 1 sur 1. Il s'agit du rectangle "unité" qui a pour aire **1 unité d'aire**. On écrit **1 u.a.**

L'aire du rectangle vert est égale à 8 fois l'aire du rectangle rouge.

L'aire du rectangle vert est donc égale à **8 u.a.**


Lorsque les longueurs unitaires sont connues, il est possible de convertir les unités d'aire en unités de mesure (le cm^2 par exemple).



2) Définition

Définition : Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a ; b]$.

On appelle **intégrale** de f sur $[a ; b]$ l'aire, exprimée en u.a., de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.



3) Notation

L'intégrale de la fonction f sur $[a ; b]$ se note :

$$\int_a^b f(x) dx$$

Et on lit « intégrale de a à b de $f(x) dx$ ».

Remarques :

- a et b sont appelés les **bornes d'intégration**.

- x est la **variable d'intégration**. Elle peut être remplacée par toute autre lettre qui n'intervient pas par ailleurs.

Ainsi on peut écrire : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$.

" dx " ou " dt " nous permet de reconnaître la variable d'intégration.




Cette notation est due au mathématicien allemand *Gottfried Wilhelm von Leibniz* (1646 ; 1716). Ce symbole fait penser à un "S" allongé et s'explique par le fait que l'intégral est égal à une aire calculée comme somme infinie d'autres aires.

Plus tard, un second mathématicien allemand, *Bernhard Riemann* (1826 ; 1866) établit une théorie aboutie du calcul intégral.

Exemple :

L'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 1$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 1$ est l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle $[-2 ; 1]$ et se note :

$$\int_{-2}^1 x^2 + 1 dx$$



Méthode : Déterminer une intégrale par calculs d'aire (1)


 Vidéo <https://youtu.be/jkxNKkmEXZA>

a) Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ dans un repère orthonormé.

b) Calculer $\int_{-1}^5 f(x) dx$.

Correction

a)



b) Calculer $\int_{-1}^5 f(x) dx$ revient à calculer l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 5$.

Donc par dénombrement, on obtient : $\int_{-1}^5 f(x) dx = 21 \text{ u.a.} + 3 \text{ u.a.} = 24 \text{ u.a.}$


4) Encadrement de l'intégrale d'une fonction monotone et positive

Soit une fonction f continue, positive et monotone sur un intervalle $[a ; b]$.

On partage l'intervalle $[a ; b]$ en n sous-intervalles de même amplitude $l = \frac{b-a}{n}$.

Sur un sous-intervalle $[x ; x + l]$, l'aire sous la courbe est comprise entre l'aire de deux rectangles :

- l'un de dimension l et $f(x)$ qui a pour aire : $l \times f(x)$;
- l'autre de dimension l et $f(x + l)$ qui a pour aire $l \times f(x + l)$.



Sur l'intervalle $[a ; b]$, l'aire sous la courbe est comprise entre la somme des n rectangles "inférieurs" et la somme des n rectangles "supérieurs".

Voici un algorithme écrit en langage naturel permettant d'obtenir un tel encadrement :

| Langage naturel |
|-------------------------------------|
| Définir fonction rectangle(a, b, n) |
| $L \leftarrow (b-a)/n$ |
| $x \leftarrow a$ |
| $m \leftarrow 0$ |
| $p \leftarrow 0$ |
| Pour i allant de 0 à n-1 |
| $m \leftarrow m+Lx f(x)$ |
| $x \leftarrow x+L$ |
| $p \leftarrow p+Lx f(x)$ |
| FinPour |
| Afficher m et p |

Exemple :

Avec Python, on programme cet algorithme pour la fonction $f(x) = x^2$ sur l'intervalle $[1 ; 2]$.

On exécute plusieurs fois le programme pour obtenir un encadrement de l'intégrale de la fonction carré sur $[1 ; 2]$.


```
def rectangle(a,b,n):
    l=(b-a)/n
    x=a
    m=0
    p=0
    for i in range(0,n):
        m=m+l*x**2
        x=x+l
        p=p+l*x**2
    return m,p
```

En augmentant le nombre de sous-intervalles, la précision du calcul s'améliore car l'encadrement formé de rectangles inférieurs et supérieurs se resserre autour de la courbe.

```
>>> rectangle(1,2,10)
(2.1850000000000014, 2.4850000000000017)
>>> rectangle(1,2,50)
(2.3034000000000017, 2.3634000000000017)
>>> rectangle(1,2,100)
(2.3183500000000003, 2.3483500000000026)
>>>
```

On en déduit que : $2,31 < \int_1^2 x^2 dx < 2,35$

Il est possible de vérifier avec la calculatrice :



Calculer une intégrale avec la calculatrice :

- ▶ Vidéo TI <https://youtu.be/OY3VT73yvVY>
- ▶ Vidéo Casio https://youtu.be/hHxmizmbY_k
- ▶ Vidéo HP <https://youtu.be/4Uu5tQGjwbo>

5) Extension aux fonctions de signe quelconque


Propriété : Soit f une fonction continue et NÉGATIVE sur un intervalle $[a ; b]$.

L'aire, exprimée en u.a., de la surface délimitée par :

- la courbe représentative de la fonction f ,
- l'axe des abscisses,
- et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$

est égal à :

$$-\int_a^b f(x) dx$$



Propriétés sur les bornes d'intégration :

$$a) \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$b) \int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$$

$$c) \text{ Relation de Chasles : } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Méthode : Déterminer une intégrale par calculs d'aire (2)

▶ Vidéo <https://youtu.be/l2zuaZukc0g>

Représenter la droite d'équation $y = 3 - x$ dans un repère.

En déduire $\int_2^5 3 - x dx$ en effectuant des calculs d'aire.

Correction

La droite d'équation $y = 3 - x$ coupe l'axe des abscisses en $x = 3$.

Donc, $3 - x \geq 0$ sur l'intervalle $[2 ; 3]$


Et, $3 - x \leq 0$ sur l'intervalle $[3 ; 5]$.

D'après la relation de Chasles, on a :

$$\int_2^5 3 - x \, dx = \int_2^3 3 - x \, dx + \int_3^5 3 - x \, dx$$

Donc :

$$\int_2^5 3 - x \, dx = \frac{1 \times 1}{2} + \left(-\frac{2 \times 2}{2} \right) = -1,5$$



Remarque :

Si une intégrale est nulle, alors la fonction n'est pas nécessairement nulle.

On a par exemple :


$$\int_{-2}^2 x^3 \, dx = 0$$

En effet, la courbe représentative de la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine du repère, donc :

$$\int_{-2}^0 x^3 \, dx = -\int_0^2 x^3 \, dx$$

Et donc :

$$\int_{-2}^2 x^3 \, dx = \int_{-2}^0 x^3 \, dx + \int_0^2 x^3 \, dx = 0$$




Partie 2 : Intégrale et primitive

1) Fonction définie par une intégrale

Théorème : Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a ; b]$.

La fonction F définie sur $[a ; b]$ par :

$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .



Méthode : Étudier une fonction définie par une intégrale

Vidéo <https://youtu.be/6DHW5TRzN4>

Soit F la fonction définie sur $[0 ; 10]$ par : $F(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt$.

- Étudier les variations de F .
- Tracer sa courbe représentative.

Correction

a) $t \mapsto \frac{t}{2}$ est continue et positive sur $[0 ; 10]$ donc F est dérivable sur $[0 ; 10]$ et $F'(x) = \frac{x}{2} > 0$.


Donc F est croissante sur $[0 ; 10]$.

On dresse le tableau de variations :

| | | |
|---------|---|----|
| x | 0 | 10 |
| $F'(x)$ | + | |
| $F(x)$ | 0 | 25 |


$F(x)$ est égal à l'aire du triangle rouge.

Ainsi $F(10) = \frac{10 \times 5}{2} = 25 \text{ u. a.}$



b) Pour tout x de $[0 ; 10]$, on a $F(x) = \frac{x \times \frac{x}{2}}{2} = \frac{x^2}{4} \text{ u. a.}$

On a ainsi la représentation graphique de F :



2) Calcul d'intégrales

Propriété : Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a ; b]$.

Si F est une primitive de f alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Définition : Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b deux réels de I et F une primitive de f sur $[a ; b]$.

On appelle **intégrale** de f sur $[a ; b]$ la différence $F(b) - F(a)$.

Notation :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Rappels de la classe de 1^{ère} : Primitives des fonctions usuelles

| Fonction | Primitive |
|-------------------------------------|---|
| $f(x) = a, a \in \mathbb{R}$ | $F(x) = ax$ |
| $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$ | $F(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1}$ |
| $f(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ | $F(t) = \frac{A}{\omega} \sin(\omega t + \varphi)$ |
| $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ | $F(t) = -\frac{A}{\omega} \cos(\omega t + \varphi)$ |

Méthode : Calculer une intégrale à partir d'une primitive

📺 Vidéo <https://youtu.be/8ci1RrNH1L0>

Calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_1^4 x^2 dx$$

$$B = \int_2^5 3x^2 + 4x - 5 dx$$

$$C = \int_0^\pi 4 \cos(t + \pi) dt$$

Correction

$$A = \int_1^4 x^2 dx$$

On a : $f(x) = x^2$

Une primitive de f est la fonction F telle que : $F(x) = \frac{1}{3}x^3$

Donc :

$$A = \int_1^4 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_1^4 = F(4) - F(1) = \frac{1}{3} \times 4^3 - \frac{1}{3} \times 1^3 = \frac{63}{3}$$

$$B = \int_2^5 3x^2 + 4x - 5 dx$$

On a : $f(x) = 3x^2 + 4x - 5$

Une primitive de f est la fonction F telle que : $F(x) = x^3 + 2x^2 - 5x$

Donc :

$$\begin{aligned} B &= [x^3 + 2x^2 - 5x]_2^5 \\ &= 5^3 + 2 \times 5^2 - 5 \times 5 - (2^3 + 2 \times 2^2 - 5 \times 2) = 144 \end{aligned}$$

$$C = \int_0^\pi 4 \cos(t + \pi) dt$$

On a : $f(x) = 4 \cos(2t + \pi)$

Une primitive de f est la fonction F telle que : $F(x) = 2 \sin(2t + \pi)$

Donc :

$$\begin{aligned} C &= \int_0^\pi 4 \cos(t + \pi) dx = [2 \sin(2t + \pi)]_0^\pi = F(\pi) - F(0) \\ &= 2 \sin(2\pi + \pi) - 2 \sin(2 \times 0 + \pi) \\ &= 2 \sin(3\pi) - 2 \sin(\pi) \\ &= 0 \end{aligned}$$

3) Propriété de linéaritéPropriété :

a) Pour k réel, $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

b) $\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

Méthode : Calculer une intégrale en appliquant la linéarité

 Vidéo https://youtu.be/B9n_AArwjKw

On pose : $A = \int_0^{2\pi} \cos^2 x dx$ et $B = \int_0^{2\pi} \sin^2 x dx$

a) Calculer $A + B$ et $A - B$.

On donne : $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ et $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$

b) En déduire A et B .

Correction

a) On calcule en appliquant les formules de linéarité :

$$\begin{aligned}
 A + B &= \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx + \int_0^{2\pi} \sin^2(x) dx & A - B &= \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx - \int_0^{2\pi} \sin^2(x) dx \\
 &= \int_0^{2\pi} \cos^2(x) + \sin^2(x) dx & &= \int_0^{2\pi} \cos^2(x) - \sin^2(x) dx \\
 &= \int_0^{2\pi} 1 dx & &= \int_0^{2\pi} \cos(2x) dx \\
 &= [x]_0^{2\pi} & &= \left[\frac{1}{2} \sin(2x) \right]_0^{2\pi} \\
 &= 2\pi & &= \frac{1}{2} \sin(2 \times 2\pi) - \frac{1}{2} \sin(2 \times 0) = 0
 \end{aligned}$$

b) On a ainsi :

$$\begin{cases} A + B = 2\pi \\ A - B = 0 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} 2A = 2\pi \\ A = B \end{cases} \text{ soit : } A = B = \pi$$

2) Positivité et comparaison

Propriétés :

a) Si, pour tout x de $[a ; b]$, $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

b) Si, pour tout x de $[a ; b]$, $f(x) \geq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

Méthode : Encadrer une intégrale

Démontrer que :

$$0 \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{2}$$

Correction

Sur $[0 ; 1]$, on a : $0 \leq x^2 \leq x$. On déduit que :

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 0 dx &\leq \int_0^1 x^2 dx \leq \int_0^1 x dx \\
 \int_0^1 0 dx &= 0 \text{ et } \int_0^1 x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

D'où :

$$0 \leq \int_0^1 x^2 dx \leq \frac{1}{2}$$

© Copyright

Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.

www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales